



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Glandula suprarenalis suis D12 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Glandula suprarenalis suis D12 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Glandula suprarenalis suis D12 beachten?
3. Wie ist Glandula suprarenalis suis D12 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Glandula suprarenalis suis D12 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Glandula suprarenalis suis D12

Globuli zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

1. WAS IST GLANDULA SUPRARENALIS SUIS D12 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Glandula suprarenalis suis D12 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GLANDULA SUPRARENALIS SUIS D12 BEACHTEN?

Zu Dosierung und Dauer der Anwendung fragen Sie einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Glandula suprarenalis suis D12 ist erforderlich:

- bei Kindern:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

- in Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, soll das Arzneimittel bei Schwangeren und in der Stillzeit nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Glandula suprarenalis suis D12 mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von Glandula suprarenalis suis D12 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Glandula suprarenalis suis D12

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie Glandula suprarenalis suis D12 erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST GLANDULA SUPRARENALIS SUIS D12 ANZUWENDEN?

Die Streukügelchen unter der Zunge zergehen lassen. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Glandula suprarenalis suis D12 keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GLANDULA SUPRARENALIS SUIS D12 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch: Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Das Arzneimittel Glandula suprarenalis suis D12 enthält: In 10 g Globuli sind verarbeitet:

Wirkstoff: Glandula suprarenalis suis Dil. D12 [HAB Vorschr. 42a, D2 mit Ethanol 15% (m/m)] 0,1 g.

Sonstiger Bestandteil: Sucrose

Darreichungsform und Packungsgrößen: Globuli zum Einnehmen in Flaschen mit 10 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342 · www.reckeweg.de

Reg.-Nr.: 93909.00.00

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2016.

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.